



APEL do hodowców drobiu

**Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii**

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



PTASIA GRYPA!

Wysoce zjadliwa grypa ptaków!!!



W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

ZAKAZUJE SIĘ:

- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
- organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych ptaków,
- oferowania, prezentacji w celu sprzedaży oraz sprzedaży żywych ptaków na targowiskach oraz
- jakiegokolwiek innego sposobu zbycia ptaków, utrzymywanych w gospodarstwach.

NAKAZUJE SIĘ:

- **UTRZYMYWANIE DROBIU W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH**, uniemożliwiając mu kontakt z : innym drobiem lub ptakami dzikimi oraz zbiornikami wodnymi lub poidłami, do których ma dostęp ptactwo dzikie (np. w zamkniętych budynkach, zabezpieczonych przed dostępem innych ptaków niż utrzymywane w gospodarstwie),
- zabezpieczenie i przechowywanie paszy dla drobiu w sposób uniemożliwiający jej kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmienie i pojenie drobiu w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych nasączonych roztworem środka dezynfekcyjnego przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób,
- **STOSOWANIE ODDZIEŻY OCHRONNEJ** przeznaczonej do użytku tylko w konkretnym budynku gospodarskim, w którym utrzymywany jest drób,
- **DOKONYWANIE CODZIENNEGO PRZEGLĄDU STADA DROBIU**,
- **W PRZYPADKU STWIERDZENIA**: zwiększonej śmiertelności, znacznego spadku pobierania paszy i wody, duszności, biegunki, nagłego spadku nieśności, sinicy, wybroczyn, objawów nerwowych takich jak: skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, nieskoordynowanych ruchów, o ww. fakcie **NIEZWŁOŻNIE POWIADOMIĆ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARI!**

!UWAGA!

PTASIA GRYPA!

Wysoce zjadliwa grypa ptaków!!!



Wirus przenoszą głównie ptaki dzikie i człowiek.

Objawy u ptaków:

- zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;
 - spadek dziennej produkcji jaj;
 - spadek przyjęcia paszy lub wody;
 - objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skrzęty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka.
- W czasie przybycia odpowiednich służb należy wstrzymać się od wywożenia, wynoszenia i sprzedaży mięsa, innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zwłok, paszy, ściółki i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiły objawy wskazujące na ptasią gripę.
- Objawy u ludzi: zapalenie spojówek, gorączka, ciężkie zapalenie płuc.

W przypadku wykrycia objawów u drobiu należy niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo najbliższą lecznicę dla zwierząt.

- Drób należy utrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach.
- **PTAKOM POZOSTAJĄCYM W ZAMKNIĘCIU NALEŻY ZAPEWNIĆ DOBRE WARUNKI ZOOHIGIENICZNE!!!**
- Należy szczególnie zamykać pojemniki z paszą i wodą, aby zabezpieczyć je przed dostępem ptaków dzikich.
- Przed wejściem do kurnika należy: umyć ręce i założyć odzież i obuwie ochronne, których nie używa się do innych prac, po wyjściu pozostawić odzież i obuwie ochronne w kurniku i ponownie umyć ręce.
- Przed wejściem do gospodarstwa i do kurników należy rozłożyć maty nasączone roztworem odkażającym o właściwym stężeniu i dbać o jego stałe uzupełnianie.
- Należy ograniczyć ruch ludzi postronnych i obcych pojazdów na terenie gospodarstwa (paszowozy, maszyny gospodarskie) oraz obrót drobiem.
- Osoby mające kontakt z drobiem, powinny poddać się szczepieniom ochronnym i nie powinny mieć kontaktu z innym ptactwem (gołębie, ptaki egzotyczne).
- Osoby o obniżonej odporności, osoby starsze, dzieci nie powinny wchodzić do kurnika.

! UWAGA !

CHOROBA MOŻE BYĆ TEŻ NIEBEZPIECZNA DLA LUDZI

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są na stronie Głównego Lekarza Weterynarii:

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow>
[w](#)

Źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii